

# ALBICOCCHI

VARIETA'	VIGORIA			PRODUTTIVITA'				FIORITURA			PEZZ. FRUT			FORMA FRUTTI				CARATT. POLPA				CARATT. ORGAN				COL. FRUTT			DESTIN		EPOCA DI RACC				
	elevata	media	scarsa	elevata	media	scarsa	costante	incostante	precoce	media	tardiva	grossa	media	piccola	oblunga	ovata	ellittica	rotonda	soda	mediam soda	molle	succosa	poco succosa	acidula	dolce	ottime	buone	medie	scarse	giallo		arancio	rosso	consumo fresco	trasform industriale
Baracca	*			*					*	*	*	*		*	*			*								*				*					1-11 lug
Bebeco	*			*				*	*		*				*	*			*					*		*			*	*	*			10-20 giu	
Boccucia	*			*				*	*		*	*			*	*			*				*			*					*			18-28 giu	
Boccucia liscia	*			*				*	*		*	*			*	*			*				*			*								28g-8 lug	
Canino	*			*			*	*	*		*	*			*	*			*				*		*						*			17-27 giu	
Cafona	*			*			*	*	*		*	*			*	*			*				*		*					*				15-25 giu	
Earlibil								*	*															*					*	*			5-15 giu		
Fracasso	*			*			*	*	*		*	*			*	*			*						*				*					29g-9 lug	
Ivonne Liverani	*			*			*	*	*		*	*			*	*			*						*		*							15-25 giu	
Monaco Bello	*			*				*	*		*	*			*	*			*						*	*	*							9-19 giu	
Quardi	*			*				*	*		*	*			*	*			*						*		*							30m-7 giu	
Palumella	*			*			*	*	*		*	*			*	*			*				*	*		*					*			20-30 giu	
Pelese di Giove	*			*				*	*		*	*			*	*			*				*		*					*				24g-4 lug	
Pellecchiella	*			*				*	*		*	*			*	*			*				*		*					*				26g-6 lug	
Portici Sel.6	*			*				*	*		*	*			*	*			*				*		*									24g-4 lug	
Portici Sel.2	*			*				*	*		*	*			*	*			*				*		*									24g-4 lug	
Precoce d'Imo	*			*	*			*	*		*	*			*	*			*				*		*									11-21 giu	
Reale d'Imola	*			*			*	*	*		*	*			*	*			*				*		*									27g-7 lug	
San Castrese	*			*				*	*		*	*			*	*			*				*		*									18-28 giu	
San Francesco	*			*	*			*	*		*	*			*	*			*				*		*									1-10 lug	
Tirinthos	*			*			*	*	*		*	*			*	*			*				*		*									2-12 giu	
Vitillo	*			*				*	*		*	*			*	*			*				*		*				*					20-30 giu	

## CARATTERISTICHE PORTAINNESTI DA SEME

Franco Comune	Ottenuto da seme, induce problemi di omogeneità vegetativa. Si ottengono piante molto vigorose, ma ritarda sensibilmente l'entrata in produzione. Si può utilizzare in terreni secchi, pietrosi, ben drenati ed anche calcarei.
Pesco Franco	Nell'albicocco anticipa la messa a frutto e la maturazione, ma presenta disaffinità d'innesto. Buono per terreni sciolti e drenati.
Mirabolano	E' il portainnesto più utilizzato per l'albicocco, per la sua rusticità si adatta a quasi tutti i tipi di terreno. L'affinità non perfetta con l'albicocco e l'elevata eterogeneità con possibili conseguenze su fioritura, vigoria ecc., costituiscono un limite ad una maggiore diffusione.

## CARATTERISTICHE PORTAINNESTI CLONALI

Mirabolano B	Selezione del Mirabolano ottenuta dalla stazione East Malling. Ha elevata vigoria, induce una mediocre produttività e un anticipo sulla fioritura di diversi giorni, per cui in alcune zone accentua i problemi dovuti a gelate tardive. Alcune cv di albicocco sono disafini. Esige terreni freschi e fertili.
GF 667	Ibrido naturale pesco per mandorlo. E' molto vigoroso, ottimo in terreni siccitosi, collinari e calcarei fino a percentuali del 15%. Produttivo, induce al nord una raccolta posticipata di alcuni giorni. Presenta una scarsa affinità d'innesto per diverse cv di albicocco.
Rubira	Ottenuto dall'I.N.R.A., facilmente riconoscibile per il fogliame rosso, induce una buona vigoria ed una media produttività.